



31993L0079

Richtlijn 93/79/EEG van de Commissie van 21 september 1993 tot vaststelling van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bij te houden lijsten van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan

Publicatieblad Nr. L 256 van 14/10/1993 blz. 0025 - 0031

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 53 blz. 0017

RICHTLIJN 93/79/EEG VAN DE COMMISSIE van 21 september 1993 tot vaststelling van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bij te houden lijsten van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (1), gewijzigd bij Beschikking 93/401/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 9, lid 6,

Overwegende dat er op internationaal niveau reeds een systeem voor de beschrijving van rassen bestaat; dat de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) zo'n systeem heeft uitgewerkt;

Overwegende dat het wenselijk is voor het communautaire systeem gebruik te maken van de ervaring die op internationaal niveau is opgedaan;

Overwegende dat er voor leveranciers wier werkzaamheden zich beperken tot het op de markt brengen van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan, minder strenge eisen zouden moeten gelden;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze richtlijn worden aanvullende uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot de door leveranciers krachtens artikel 9, lid 2, onder ii), van Richtlijn 92/34/EEG bij te houden lijsten van rassen van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan.

Artikel 2

1. In de door leveranciers bij te houden lijsten worden vermeld:

- i) de naam van het ras en, in voorkomend geval, de algemeen bekende synoniemen;
- ii) gegevens over de instandhouding van het ras en het toegepaste vermeerderingssysteem;
- iii) een beschrijving van het ras ten minste aan de hand van de kenmerken en de uitingsvormen, volgens het in de bijlage aangegeven schema;
- iv) voor zover mogelijk, gegevens over de verschillen van het ras ten opzichte van rassen die er het sterkst op gelijken.

2. Het bepaalde in lid 1, onder ii) en iv), is niet van toepassing op leveranciers wier werkzaamheden zich beperken tot het in de handel brengen van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 1994 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de voornaamste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 september 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 157 van 10. 6. 1992, blz. 10.

(2) PB nr. L 177 van 21. 7. 1993, blz. 28.

BIJLAGE

RASKENMERKEN EN UITINGSVORMEN Citrus sp.

Jonge scheut: anthocyaankleuring van de top (10 tot 15 cm vanaf de top)

ontbrekend

aanwezig

Vrucht: vorm van het distale einde

ingezonken

afgeplat

afgerond

licht uitgestulpt

sterk uitgestulpt

Vrucht: kleur van de schil

groen

groen tot geel

geel

geel tot oranje

oranje

oranje tot rood

roze

rood

paars

Rijptijd van de vrucht

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Corylus avellana L.

Tijdstip van het uitlopen (twee bladeren uit de knop)

zeer vroeg

zeer vroeg tot vroeg

vroeg

vroeg tot midden

midden

midden tot laat

laat

laat tot zeer laat

zeer laat

Bloeitijd mannelijke bloemen

zeer vroeg

zeer vroeg tot vroeg

vroeg

vroeg tot midden

midden

midden tot laat

laat

laat tot zeer laat

zeer laat

Bloeitijd vrouwelijke bloemen

zeer vroeg

zeer vroeg tot vroeg

vroeg

vroeg tot midden

midden

midden tot laat

laat

laat tot zeer laat

zeer laat

Omhulsel: lengte ten opzichte van de lengte van de vrucht

korter

gelijk

langer

Omhulsel: insnijding

zwak

midden

sterk

Omhulsel: vertanding van de insnijdingen

zwak

midden

sterk

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: vorm

bolvormig

kegelvormig

eivormig
kort cilindervormig
lang cilindervormig
Rijptijd
zeer vroeg
zeer vroeg tot vroeg
vroeg
vroeg tot midden
midden
midden tot laat
laat
laat tot zeer laat
zeer laat
Vrucht: percentage kern (gewicht)
zeer laag
laag
midden
hoog
zeer hoog
Cydonia Mill.
Plant: habitus
opgaand
halfopgaand
gespreid
Bladschijf: vorm
elliptisch
omgekeerd eivormig
eivormig
rond
Vrucht: algemene vorm
bolvormig
eivormig
peervormig
ingesnoerd
onregelmatig
langwerpig
Fragaria x ananassa Duch.
Bloeiwijze: stand ten opzichte van de bladeren
daarbeneden
gelijk
daarboven
Vrucht: grootte
zeer klein
klein
midden
groot
zeer groot

Vrucht: meest voorkomende vorm

niervormig

afgeplat bolvormig

rond

kegelvormig

dubbelkegelvormig

bijna cilindrisch

wigvormig

eivormig

hartvormig

Vrucht: kleur

witachtig geel

lichtoranje

oranje

oranjerood

rood

paars

donkerpaars

Rijptijd (50 % van de planten met rijpe vruchten)

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Frequentie vruchtdracht

niet doordragend

halfdoordragend

volledig doordragend

Juglans regia L.

Tijdstip van het uitlopen

zeer vroeg

zeer vroeg tot vroeg

vroeg

vroeg tot midden

midden

midden tot laat

laat

laat tot zeer laat

zeer laat

Boom: type vrouwelijk bloemstelsel

enkelvoudig

samengesteld

Boom: vertakkingswijze vrouwelijke bloemtakken

onbepaald

bepaald

Rijptijd

vroeg

vroeg tot midden
midden
midden tot laat
laat
Malus Mill.
Boom: groeikracht
zwak
midden
sterk
Vrucht: vorm
bolvormig
bol/kegelvormig
kort bol/kegelvormig
afgeplat
afgeplat bolvormig
kegelvormig
lang kegelvormig
afgeknot kegelvormig
ellipsvormig
ellips/kegelvormig (ovaal)
langwerpig
langwerpig kegelvormig
langwerpig ingesnoerd
Vrucht: dekkleur van de schil
oranje
rood
paars
bruinachtig
Begin van de bloei (10 % van de bloemen open)
zeer vroeg
vroeg
midden
laat
zeer laat
Eetrijpheid
zeer vroeg
vroeg
midden
laat
zeer laat
Onderstamrassen
Boom: groeikracht (in het moerbed)
zwak
midden
sterk
Boom: aantal basale scheuten (in het moerbed)
zeer weinig

weinig
midden
groot
zeer groot
Olea europaea L.
Vrucht: vorm
langwerpig
elliptisch
bolvormig
Vrucht: stekeltje
afwezig
aanwezig
Vrucht: vorm van de basis
afgerond
afgeplat
ingezonken
Vrucht: omvang steelholte
smal
midden
breed
Prunus amygdalus Batsch
Begin van de bloei
zeer vroeg
zeer vroeg tot vroeg
vroeg
vroeg tot midden
midden
midden tot laat
laat
laat tot zeer laat
zeer laat
Bloem: kleur van de kroonbladen
wit
roze-wit
roze
donkerroze
Rijptijd
zeer vroeg
vroeg
midden
laat
zeer laat
Droge vrucht: vorm van de punt
afgeplat
afgerond
spits
Pit: vorm

smal elliptisch

elliptisch

breed elliptisch

zeer breed elliptisch

Prunus armeniaca L.

Vrucht: grootte

klein

midden

groot

Vrucht: diepte van de steelholte

ondiep

midden

diep

Vrucht: basiskleur van de schil

wit

crème tot geel

lichtoranje

oranje

donkeroranje

Vrucht: kleur van het vruchtvlees

wit

crème

lichtoranje

oranje

donkeroranje

Begin van de bloei (sommige bloemen volledig geopend)

vroeg

midden

laat

Rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Prunus avium L.

Prunus cerasus L.

Bloei

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: kleur van de schil

geel

oranjerood

vermiljoen op lichtgele ondergrond

vermiljoen

mahonie

zwart

Vrucht: rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Prunus domestica L.

Vrucht: grootte (fysiologisch rijpe vruchten)

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: algemene vorm in profiel (fysiologisch rijpe vruchten)

afgeplat rond

rond

langwerpig

slank

Vrucht: basiskleur van de schil (dauw niet verwijderd; fysiologisch rijpe vruchten)

witachtig (doorschijnend)

groen

groengeel

geel

oranjegeel

rood

paars

violetblauw

Vrucht: kleur van het vruchtvlees (fysiologisch rijpe vruchten)

witachtig

geel

groengeel

groen

oranje

rood

Steen: vasthechting aan het vruchtvlees (fysiologisch rijpe vruchten)

geen

matig

sterk

Steen: grootte in verhouding tot de vrucht (fysiologisch rijpe vruchten)

klein

midden

groot

Rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Prunus persica L. Batsch

Boom: type

normaal

spur

Bloeiende scheut: anthocyaninekleuring

ontbrekend

aanwezig

Begin van de bloei

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Bloem: vorm

roosvormig

klokvormig

Kroonblad: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Bladsteel: honingklieren

ontbrekend

aanwezig

Bladsteel: vorm van de honingklieren

rond

niervormig

Vrucht: beharing

ontbrekend

aanwezig

Vrucht: basiskleur van het vruchtvlees

wit

geel tot oranjegeel

rood

Steen: vasthechting aan het vruchtvlees

ontbrekend

aanwezig

Rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Prunus salicina Lindl.

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: basiskleur van de schil

witachtig (doorschijnend)

groen

geelachtig groen

geel

oranje tot geel

rood

paars

violetblauw

donkerblauw

Vrucht: kleur van het vruchtvlees

witachtig

geel

geelachtig tot groen

groen

oranje

rood

Bloeitijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Pyrus communis L.

Bloei (tijdstip volle bloei)

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: vorm in profiel (lengtedoorsnede)

concaaf

recht

convex

Vrucht: lengte in verhouding tot maximumdiameter

zeer kort

kort

midden

lang

zeer lang

Vrucht: basiskleur van de schil (bij rijpe vrucht)

groen

geelgroen

geel

rood

Vrucht: lengte van de steel

kort

midden

lang

Plukrijpheid

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Ribes silvestre (Lam) Mert. DW. D. J. Koch (rode bes)

Ribes niveum Lindl. (witte bes)

Rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Vruchtros: lengte met inbegrip van de steel

zeer kort

kort

midden

lang

zeer lang

Bes: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Bes: kleur

wit

witachtig geel

roze

rood

Ribes uva crispa L. (kruisbes)

Plant: vorm

omgekeerd eivormig

bolvormig

liggend elliptisch

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: vorm

bolvormig

elliptisch

peervormig

Vrucht: kleur

geel

geelgroen

groen met witte nuance

groen

rood

Vrucht: rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Ribes nigrum L. (zwarte bes)

Plant: verhouding hoogte/diameter

klein

midden

groot

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi en Ursini en hybriden

Plant: groeiwijze

opgaand

opgaand tot halfopgaand

halfopgaand

halfopgaand tot kruipend

kruipend

Slapende twijg: stekels

ontbrekend

aanwezig

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Begin rijptijd

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat

Rubus idaeus L. (framboos)

Plant: aantal jonge scheuten

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Enkel rassen die in de zomer vrucht dragen op de twijgen van het voorgaande jaar

Slapende twijg: kleur

grijsbruin

grijsbruin tot bruin

bruin

bruin tot paarsbruin

paarsbruin

Vrucht: kleur

geel

lichtrood

middenrood

donkerrood

oranje

paars

zwart

Vrucht: grootte

zeer klein

klein

midden

groot

zeer groot

Vrucht: verhouding lengte/breedte

even lang als breed

langer dan breed

veel langer dan breed

Belangrijkste vruchtdracht:

in de zomer, op twijgen van het voorgaande jaar

in de herfst, op twijgen van hetzelfde jaar

Tijdstip van rijping op twijgen van het voorgaande jaar

zeer vroeg

vroeg

midden

laat

zeer laat
